

បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺគ្រុនឈាម
កាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍: ៩ មករាឆ្នាំ ២០១៤

ឆ្នាំ ២០១២-២០១៣

ដោយ វេជ្ជ, ច ម៉េងចូ

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ- បាណកសាស្ត្រ

ព័ត៌មានថ្មី

ចំនួនស្លាប់គ្រុនឈាមនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៣ នេះ៥៩នាក់គឺថយចុះ៦៩%បើប្រៀបធៀបរយៈកាល ដូចគ្នាឆ្នាំ២០១២ ដែលមាន១៨៩នាក់។ ចំនួនករណីឈឺឆ្នាំ២០១៣ មាន១៧៥៣៣នាក់គឺថយចុះ៥៩%បើប្រៀបធៀបរយៈពេលរយៈ ពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១២ដែលមាន៤២៣៦២នាក់។ អត្រាឈឺគិតជាចំនួនឈឺក្នុងប្រជាជន១សែននាក់ ឆ្នាំ២០១៣ មាន ១១៩ករណី។

គួរកត់សំគាល់ថាឆ្នាំនេះ ខេត្តដែលមានអត្រាឈឺខ្ពស់គឺភាគច្រើនខេត្តដែលនៅជាប់ឬជិតព្រំដែនថៃខេត្តកណ្តាលខេត្តកំពង់ចាមចំណែកខេត្តជាប់ព្រំដែនវៀតណាមមានអត្រាឈឺទាបដោយសារអាចពាក់ព័ន្ធសភាពការណ៍តំបន់ដូចជារបខាងក្រោម។

កម្ពុជាធ្លាប់មានផ្ទះគ្រុនឈាម ឆ្នាំ២០០៧ដែលកាលណោះមានឈឺ ៣៩ ៤៦០ករណីស្លាប់៤០៤នាក់ ហើយការផ្ទុះឆ្នាំ២០១២មានឈឺ៤០ ៩០៩ករណីស្លាប់១៨៩។ តាមការសង្កេតនិទ្ទាការរីក ឡើងចាប់តាំងពី ឆ្នាំ១៩៩៨ មកការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជា មិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង គ្រោះទឹកជំនន់ទេព្រោះថាឆ្នាំដែលមានការផ្ទុះរាតត្បាតគ្រុនឈាមគឺឆ្នាំ ១៩៩៨ ឆ្នាំ២០០៧ ឆ្នាំ២០១២ ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំទាំងនោះគ្មានគ្រោះទឹកជំនន់ទេ។ ប៉ុន្តែឆ្នាំ ២០០០ និងឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមានគ្រោះទឹកជំនន់បែរជាគ្មានការផ្ទុះរាតត្បាតទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជាទេវិញ។

គិតជាមធ្យមក្នុងជំងឺគ្រុនឈាម១០០០នាក់ តែងស្លាប់១០,២នាក់នៅឆ្នាំ២០០៧ ស្លាប់៤,៤នៅឆ្នាំ២០១២ និងស្លាប់៣,៤នាក់នៅឆ្នាំ២០១៣ ក្នុងឈឺ១០០០ករណី។

ការថយចុះអត្រាស្លាប់មធ្យមក្នុងជំងឺ១០០០នាក់នេះ ដោយមូលហេតុចំនួន២ គួបផ្សំគ្នាគឺ:

ទី១-មាតាបិតាយលឺដឹងកាន់តែច្រើន ប្រញាប់បញ្ជូនអ្នកជំងឺមកមន្ទីរពេទ្យ រដ្ឋទាន់ពេលវេលា។

ទី២-ការកើនឡើងនៃគុណភាពសេវាសុខាភិបាលរដ្ឋ។

ទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដោយទោះគ្មានសញ្ញាផ្ទុះរាតត្បាតទូទាំងប្រទេសយើង ក៏ដោយព្រោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

មិនទាន់មានប្រទេសណាគេបង្កើតការផ្ទុះរាតត្បាតគ្រុនឈាមទេមិនថាជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ ឬទាបទេ ជាពិសេសឆ្នាំ២០១៣ នេះ

ក្នុងខណៈ ដែលកម្ពុជាគ្មានការផ្ទុះរាតត្បាតស្ថានភាពគ្រុនឈាមប្រទេសជិតខាងយើងមានសភាពការណ៍អាក្រក់ ជាងឆ្នាំមុនយ៉ាងច្រើនគួរ ឱ្យបារម្ភណ៍។ តាមបាងប៊ុស្តី នៅប្រទេសថៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា មានគ្រុនឈាម ជិត១៤ម៉ឺនករណីក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ។ ចំណែកសាំងឡួន ក្នុងឆ្នាំ២០១៣

មានផ្ទុះរាតត្បាតដែលមានគ្រុនឈាមជិត២ម៉ឺននាក់នាំឱ្យអត្រាលើក្នុងប្រជាន់១ សែន នាក់កើនដល់៤២ករណី ដែលស្មើនឹង៣,៥ដងនៃអត្រាកម្ពុជា (១១៩/១ សែន) ក្នុងរយៈកាលដូចគ្នា ហើយការផ្ទុះរាតត្បាតបានអូសបន្លាយតាំងពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំ២០១៣ និងករណីយើងដើមខែមករាឆ្នាំ២០១៤នៅបន្តកើនឡើងនៅឡើយ (សូមអានក្រាហ្វិកនៅ <http://www.dengue.gov.sg/subject.asp?id=73>) ។

នៅប្រទេសឡាវឆ្នាំ២០១៣ ករណីយើងកើនជាង៤ដងលើស ឆ្នាំ២០១២ ហើយអត្រាលើស្មើ នឹង៦ដងនៃអត្រានៅកម្ពុជា។ ផ្ទុយទៅវិញនៅឆ្នាំ ២០១៣

ចំនួនករណីគ្រុនឈាមរៀតណាមថយចុះ ហើយអត្រាលើសមានទាបជាងអត្រាកម្ពុជា។ **ហេតុនេះយើងឃើញខេត្តកម្ពុជាដែល លានៅ ជិត/ ជាប់ ប្រទេសរៀតណាមភាគច្រើនមានអត្រាលើសទាបជាង ខេត្តដែលនៅជិត/ ជាប់ប្រទេសថៃ។**

សារបានអន្តរាគមន៍ នៅកម្ពុជា អន្តរាគមន៍ជាក់ស្តែងឆ្លើយតបនឹងជំងឺគ្រុនឈាម គឺបំបាត់ជីវកម្មសត្វនិងបញ្ជូនអ្នកជំងឺជាពិសេសកុមារក្តៅខ្លួនទៅមន្ទីរពេទ្យ សារធារណៈឱ្យបានទាន់ពេល ហើយអន្តរាគមន៍ ទាំងនេះត្រូវចាប់ដំបូនបង្អស់ពី **និងគ្រួសារនីមួយៗ**

និងការចូលរួមរបស់ សហគមន៍នីមួយៗ នោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដោយទទួលស្គាល់ ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងបណ្តាញសារពើពន្ធទាំងអស់

មេត្តាជួយជំរុញចលនាទាំងនេះដើម្បីបង្រៀនសកុមារ ពីគ្រោះមរណៈ ដោយការផ្ទុះរាតត្បាតគ្រុនឈាម។ កន្លងមកនេះ **៦៩%នៃករណីគ្រុនឈាមសរុប**ជាកុមារអាយុ៥-១៤ឆ្នាំ

ដែលភាគច្រើនកំពុងរៀនក្នុងសាលាបឋមសិក្សាហេតុនេះការចូលរួមរបស់ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្ស ជាផ្នែក១ សំខាន់ណាស់ ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមព្រោះថាការយល់ដឹងរបស់សិស្សានុសិស្សអំពីគ្រុនឈាម មាន ប្រយោជន៍សំរាប់ សាមីខ្លួនផងសំរាប់មាតាបិតានិងប្អូនៗ របស់ពួកគេនៅផ្ទះផង។

សារបានទូទៅ៖ជំងឺគ្រុនឈាមបង្កដោយ “វីរុសដង្ក” ដែលចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ ទៅម្នាក់ទៀតដោយមូសខ្លាញ់ខាំ។ តាមឯកសារអង្គការសុខភាពពិភពលោកមកដល់នេះពិភពលោកមិនទាន់មានវ៉ាក់ស

ាំងការពារ ឬ ឱសថប្រឆាំងវីរុសគ្រុនឈាមទេហេតុនេះការព្យាបាល ផ្អែកជាសំខាន់
 លើការព្យាបាលសម្រន់រោគសញ្ញាប៉ុណ្ណោះហើយប្រជាជន ២៥០០ លាន នាក់កំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លង
 វីរុសគ្រុនឈាមក្នុងនោះ៧០ % នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ តាមការក្រាស់លទ្ធផលស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះរបស់
 សកលវិទ្យាល័យ អុកស្វ័ត និងមូលនិធិវ៉ែលខមត្រីសក្នុង១ឆ្នាំៗ មានប្រជាជន៣៩៦នាក់ ក្នុងសកលលោក
 បានឆ្លងវីរុសគ្រុនឈាមក្នុងនោះមាន៩៦លាននាក់ (១ភាគ៤) មានរោគសញ្ញាដែលតម្រូវឱ្យចូលសំរាកពេទ្យ ហើយមាន
 ២៩៤លាននាក់ជាអ្នកបានឆ្លងវីរុសគ្រុនឈាម ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះ មាន រោគសញ្ញាស្រាលឬគ្មានរោគសញ្ញា។ តាមទិន្នន័យនេះ
 កាលណាឃើញមាន កុមារ១នាក់ចូល
 សំរាកពេទ្យ ដោយសាររោគសញ្ញាគ្រុនឈាមនោះយើងអាចប៉ាន់ស្មានថានៅមជ្ឈដ្ឋានដែលកុមារនេះរស់នៅអាច
 មានអ្នកដែលឆ្លងវីរុសគ្រុនឈាមប្រហែល៣នាក់ជាអ្នកបានឆ្លងវីរុសគ្រុនឈាមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានរោគសញ្ញាស្រាលឬ
 គ្មានរោគសញ្ញា ហើយពួកគេ៣នាក់ដែលជាភ្នាក់ផ្ទុកវីរុសដោយមិនដឹងខ្លួនដែលមូសខ្លាញ់ខាំអាចខាំចំលងទៅ អ្នកដទៃ
 បានយ៉ាងងាយ។ ហេតុនេះកាលណាឃើញមានករណីគ្រុនឈាមចូលសំរាកពេទ្យកាន់តែច្រើនហានិយ័ភ័យ
 ក្នុងការឆ្លងមានកំរិតកាន់តែខ្ពស់ណាស់សំរាប់សហគមន៍ ដែលអ្នកជំងឺទាំងនោះរស់នៅ។
 តាមទិន្នន័យអង្គការសុខភាពពិភពលោក សរុបករណីឈឺក្នុង៣តំបន់ គឺអាមេរិក អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង
 ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចកើនកើន ប្រហែល៩០ % ក្នុងរយៈកាលតែ២ឆ្នាំ គឺឆ្នាំ២០០៨-២០១០ ។ក្នុងរយៈកាលទសវត្ស
 ឆ្នាំ២០០០ -២០១០ ចំនួនករណី គ្រុនឈាមក្នុងតំបន់អាស៊ានកើន១៩% ជាមធ្យមក្នុង១ឆ្នាំ។
 ក្នុងនោះកម្ពុជាកើន១០ %ក្នុង១ឆ្នាំ។ ក្នុងទសវត្សរ៍ដូចគ្នា។